

# Neural<sup>®</sup>

Vitamina B1  
Vitamina B6  
Vitamina B12  
Metildiazepinona  
Diclofenac potásico

## COMPRIMIDOS

### ANTINEURITICO - ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO - RELAJANTE MUSCULAR

#### COMPOSICION

##### Cada comprimido contiene:

Vitamina B<sub>1</sub> 50 mg  
Vitamina B<sub>6</sub> 100 mg  
Vitamina B<sub>12</sub> 1,000 mcg  
Metildiazepinona 1 mg  
Diclofenac potásico 50 mg  
Excipientes, c.s.

#### PROPIEDADES

Combina equilibradamente las vitaminas antineuríticas del complejo B, el poder analgésico y antiinflamatorio del diclofenac potásico y el efecto relajante muscular de la metildiazepinona.

Esta acción múltiple (analgésica-antiinflamatoria-antineurítica-miorrelajante y sedante) es altamente efectiva en todo tipo de inflamación de patologías musculoesqueléticas dolorosas.

El diclofenac potásico es un analgésico antiinflamatorio de acción rápida y potente. Como analgésico no esteroide produce esos efectos al inhibir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, las cuales desempeñan un importante papel como mediadoras de la inflamación, el dolor y la fiebre. Se ha demostrado que es un potente inhibidor de la ciclooxigenasa, una enzima del complejo prostaglandina sintetasa, por lo que se requieren concentraciones mínimas para obtener una acción analgésica y antiinflamatoria eficaz.

La metildiazepinona ha servido como modelo y guía para los relajantes musculares y se encuentra en la fórmula en la menor concentración que permita exclusivamente una acción relajante musculoesquelética.

Es la sustancia de elección en el tratamiento de la rigidez muscular por lesiones de la espina dorsal. Es particularmente útil en pacientes que tienen espasmos musculares dolorosos invalidantes más o menos continuos y que toleren la disminución de la agudeza mental y física que pueda producirse.

#### INFORMACION CLINICA

##### INDICACIONES

Neuralgias, tortícolis, neuritis y en dolores o molestias musculares debido a espasmos, ansiedad, tensión, excitación o insomnio.

##### CONTRAINDICACIONES

Miastenia gravis, trastornos de la función hepática o renal, glaucoma, hipersensibilidad a algunos de sus componentes, hipertiroidismo, arritmias ventriculares y úlcera péptica.

##### EFFECTOS INDESEABLES

Rara vez se producen erupciones cutáneas, náuseas, vómito.

##### PRECAUCIONES

No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Tener precaución en pacientes con historial sensible a la vitamina B1. Observar con cuidado el manejo de vehículos, equipos o maquinarias. Si hay úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal debe suspenderse la administración de este producto.

##### USO EN EMBARAZO, LACTANCIA Y EN NIÑOS

Está contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en pediatría.

##### INTERACCIONES:

El tratamiento concomitante con preparados de digoxina o de litio puede elevar sus niveles séricos. Puede reducir la acción de los agentes diuréticos y antihipertensivos; con los diuréticos ahorradores de potasio puede provocar hiperpotasemia. Aumenta el efecto hipoglucémico de los antidiabéticos orales de tipo sulfonilureas. El uso concomitante de glucocorticoides y otros antiinflamatorios aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. El ácido acetilsalicílico reduce la concentración sérica del diclofenaco. Administrado en un período de 24 horas junto a metotrexato eleva la concentración de éste. El uso simultáneo con anticoagulantes requiere un control conveniente del estado de coagulación de manera preventiva. Los pacientes que reciben tratamiento con L-dopa no deberán tomar preparados que contengan dosis elevadas de vitamina B6.

##### SOBREDOSIS

Las medidas terapéuticas en el caso de sobredosis son las siguientes: Lavado

gástrico y tratamiento con carbón activado, lo más rápido posible para evitar la absorción. El tratamiento sintomático y de soporte se administrará en caso de complicaciones como hipotonía, insuficiencia renal y depresión respiratoria.

##### USO Y DOSIS

La dosis normal habitual es de un comprimido 2-3 veces al día.

##### VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

##### INFORMACION FARMACEUTICA

##### DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

##### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

##### PRESENTACION

Caja conteniendo 25 tirillas de 4 comprimidos para detallar.

##### NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

Registro Sanitario No. 2001-1401

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por  
Ethical Pharmaceutical, S.R.L.  
de República Dominicana  
Registro Industrial 14109

 FLUTER<sup>®</sup> DOMULL

Pi000146

Doc. No.: YDP227

Rev.: E

Aprob. por: Gte. Desarrollo de Productos / Gte. Mercadeo