

Erocervix

Policresuleno [®]

OVULOS

**ANTIBACTERIANO, ANTIMICOTICO, HEMOSTATICO,
REEPITELIZADOR CERVICO-VAGINAL**

COMPOSICION

Cada óvulo contiene:

Policresuleno 90 mg
Excipientes, c.s.

PROPIEDADES

Restablece y mantiene el pH ácido de la cavidad vaginal; por sus propiedades químicas estimula el crecimiento del bacilo de Döderlein. Restituye la barrera fisiológica de defensa y evita la proliferación de monilias, tricomonas o bacterias. Además es queratolítico promueve la descamación del epitelio dañado y favorece la pronta reepitelización cérvico-vaginal. Por sus características la molécula no se absorbe.

Es astringente por lo que disminuye la hipersecreción característica en los procesos infecciosos vaginales.

Se disuelve por humedad y no por temperatura de ahí que su utilidad máxima sea en padecimientos cérvico-vaginales con aumento de secreciones.

Promueve la precipitación de proteínas en las secreciones cérvico-vaginales; dicha precipitación junto con la descamación del epitelio ocasionan acúmulo de desechos tisulares en la vagina, los cuales representan su efecto terapéutico.

TOXICOLOGIA

En múltiples ensayos realizados en animales de experimentación por más de 5 años, no se ha reportado ningún efecto de carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Auxiliar en flujo vaginal de etiología bacteriana, tricomoniasis y moniliasis vaginal, en las erosiones del cérvix y la vagina. Hemostasia post-electrocoagulación y post-biopsia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

EFFECTOS INDESEABLES

Se desconocen hasta la fecha.

PRECAUCIONES

Con su utilización se produce una estimulación de los procesos de cicatrización. El desprendimiento ocasional de tejido necrosado no debe suscitar ninguna preocupación por parte de la paciente. De acuerdo con la cantidad de tejido desechado puede ser necesaria una ducha vaginal al final del tratamiento.

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Actúa en forma local, por lo tanto se puede usar en cualquier periodo de la gestación y la lactancia.

INTERACCIONES

Se desconocen hasta la fecha.

SOBREDOSIS

En el caso de ingesta accidental no produzca el vómito y administre solución con bicarbonato de sodio en cantidades importantes; mantenga al paciente en reposo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar un óvulo diariamente al acostarse, durante 6-12 días (1-2 cajas).

VIA DE APLICACION

Vaginal.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre

consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

PRESENTACION

Caja conteniendo 6 alveolos de 1 óvulo.

Registro Sanitario No. 2008-0442

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por

Ethical Pharmaceutical, S.R.L.

de República Dominicana

Registro Industrial 14109