

Vertix

Betahistina



COMPRIMIDOS

ANTIVERTIGINOSO

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Betahistina mesilato 6 mg
Excipientes, c.s.

Cada comprimido contiene:

Betahistina clorhidrato 16 mg y 24 mg,
respectivamente
Excipientes, c.s.

PROPIEDADES

Es un compuesto relacionado químicamente con la histamina que actúa mejorando la microcirculación endolinfática, corrigiendo el vértigo y los tinnitus por su efecto sobre los esfínteres precapilares. Empleado precozmente puede detener la evolución del síndrome de Ménière y prevenir la disminución progresiva de la capacidad auditiva. Se puede emplear por tiempo prolongado ya que no provoca depresión del SNC ni sedación.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del síndrome vertiginoso, acúfenos e hipoacusia vinculados a trastornos del oído interno, mareos ocasionados por alteraciones del equilibrio. Síndrome de Ménière.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al producto.

EFFECTOS INDESEABLES

Gastrointestinales: Pueden ocurrir, aunque en casos raros, náuseas o vómitos. De hipersensibilidad: Aunque en casos raros, pueden presentarse tales reacciones como erupciones cutáneas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Es necesaria una dosificación cuidadosa si el paciente tiene un historial de úlcera péptica o úlcera péptica activa, asma bronquial, feocromocitoma.

USO EN EMBARAZO

No ha sido establecida la inocuidad de su uso durante el embarazo. A las mujeres embarazadas se les deberá administrar solo si se piensa que el beneficio terapéutico esperado compensa cualquier riesgo posible.

INTERACCIONES

Puede antagonizar con los antihistamínicos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, se aconseja lavado gástrico y deben ser tomadas las medidas generales del caso. No existe ningún antídoto específico.

USO Y DOSIS

La dosis y tiempo de tratamiento dependerá del criterio médico y de cada caso en particular.

Como pauta general:

VERTIX 6 mg

1-2 comprimidos 3 veces al día.

VERTIX 16 mg

1 comprimido 2-3 veces al día.

VERTIX 24 mg

1 comprimido 2 veces al día.

Los comprimidos deberán ser administrados preferiblemente después de las comidas.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar entre 15 °C y 25 °C.

PRESENTACION

Caja conteniendo 3 tirillas de 10 comprimidos.

Caja conteniendo 2 tirillas de 10 comprimidos.

NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO

Comprimidos de 6 mg: 2009-1561

Comprimidos de 16 mg: 2013-0269

Comprimidos de 24 mg: PRS-ME-2017-0046

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por

Ethical Pharmaceutical, S.R.L.

de República Dominicana

Registro Industrial 14109

FLUTER DOMULL

Pi000408

Doc. No.: YDP2612

Rev.: K

Aprob. por: Gte. Desarrollo de Productos / Gte. Mercadeo