

# Neural Forte

Diclofenac  
Vitamina B1  
Vitamina B6  
Vitamina B12  
Clorzoxazona

## COMPRIMIDOS

### ANTINEURITICO - ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO - RELAJANTE MUSCULAR

#### COMPOSICION

##### Cada comprimido contiene:

Diclofenac potásico	75 mg
Vitamina B <sub>1</sub>	100 mg
Vitamina B <sub>6</sub>	50 mg
Vitamina B <sub>12</sub>	1,000 mcg
Clorzoxazona	250 mg
Excipientes, c.s.	

#### PROPIEDADES

Combina equilibradamente el poder analgésico y antiinflamatorio del diclofenac potásico, con la acción de las vitaminas antineuríticas del complejo B y el efecto miorrelajante de la clorzoxazona.

Esta acción múltiple (analgésica-antiinflamatoria-antineurítica-miorrelajante), es altamente efectiva en todo tipo de inflamación de patologías musculoesqueléticas dolorosas.

El diclofenac potásico es un analgésico antiinflamatorio de acción rápida y potente. Como analgésico no esteroide produce esos efectos al inhibir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, las cuales desempeñan un importante papel como mediadoras de la inflamación, el dolor y la fiebre. Se ha demostrado que es un potente inhibidor de la ciclooxigenasa, una enzima del complejo prostaglandina sintetasa, por lo que se requieren concentraciones mínimas para obtener una acción analgésica y antiinflamatoria eficaz.

Las vitaminas B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> y B<sub>12</sub> participan en el metabolismo de todas las células del organismo, pero su actividad predominante se ejerce sobre las células del sistema nervioso, por lo que se les ha denominado vitaminas neurotropas.

La clorzoxazona es un miorrelajante derivado del benzoxazol que actúa principalmente en el nivel de la médula espinal y en las zonas subcorticales del cerebro, donde inhibe los arcos reflejos multisinápticos involucrados con la generación y el mantenimiento del tono del músculo esquelético.

#### TOXICOLOGIA

No existe evidencia de efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos y sobre la fertilidad en humanos y en animales de experimentación.

#### INFORMACION CLINICA

##### INDICACIONES

Relajante muscular, analgésico, antineurítico.  
Artritis reumatoide, osteoartritis, polineuropatía, neuralgia, radiculopatía, neuritis, síntomas vertebrales dolorosos, lumbalgia, lumbociática, artralgias, ciática, espasmos musculares.

##### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus principios activos. Trastornos hematopoyéticos no aclarados. Úlcera gástrica y duodenal. Niños menores de 12 años y en pacientes cuyos ataques de asma bronquial, rinitis o urticaria son causados por el ácido acetilsalicílico o sus derivados.

##### EFFECTOS INDESEABLES

Ocasionalmente se han observado: Vómitos, diarrea, cefaleas, irritabilidad, insomnio, cansancio, mareos, erupción cutánea y prurito.

##### PRECAUCIONES

Si hay úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal debe suspenderse la

administración de este producto.

Tener precaución en pacientes con historial sensible a la vitamina B1.

##### USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Su uso durante el embarazo y la lactancia queda a criterio médico.

##### INTERACCIONES

Debe evitarse el uso simultáneo con otros medicamentos como: Digoxina, litio, diuréticos, antihipertensivos, glucocorticoides, metotrexato, ácido acetilsalicílico y L-dopa.

La administración concomitante de clorzoxazona y depresores del SNC como alcohol, anestésicos generales, IMAO, analgésicos opiáceos y antidepresivos tricíclicos, puede requerir ajuste de dosis de uno de los medicamentos para prevenir aumento de depresión del SNC, de depresión respiratoria o de efecto hipotensor.

##### SOBREDOSIS

Las medidas terapéuticas en el caso de sobredosis son las siguientes: Lavado gástrico y tratamiento con carbón activado, lo más rápido posible para evitar la absorción. El tratamiento sintomático y de soporte se administrará en caso de complicaciones como hipotonía, insuficiencia renal y depresión respiratoria.

##### USO Y DOSIS

Salvo criterio contrario del médico, un comprimido 2-3 veces al día.

##### VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

**Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.**

**En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.**

##### INFORMACION FARMACEUTICA

##### DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

##### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

##### PRESENTACION

Caja conteniendo 2 tirillas de 6 comprimidos.

Caja conteniendo 25 tirillas de 4 comprimidos para detallar.

##### NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

**Registro Sanitario No. 2012-0477**

**Venta por receta médica.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Producto fabricado por  
Ethical Pharmaceutical, S.R.L.  
de República Dominicana  
Registro Industrial 14109**

**FLUTER<sup>®</sup> DOMULL**

Doc. No.: YDP2913  
Rev.: G  
Aprob. por: Gte. Desarrollo de Productos / Gte. Mercadeo

**Pi000445**